

平成23年8月23日

都道府県医師会、郡市区医師会  
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長  
保坂 シゲリ

小児に係るインフルエンザワクチンの用法・用量の変更について

「インフルエンザワクチンの安定供給対策について」（平成23年8月23日付（地Ⅲ101））でお知らせいたしましたとおり、8月8日付でインフルエンザワクチンの小児に係る用法・用量が下記のとおり変更されました。

用量の変更とともに、インフルエンザワクチンの6ヶ月未満の者に対する接種が全メーカーで適用外となりましたことに特にご留意いただきたいと存じます。

つきましては、貴職におかれましても、本件についてご了知いただき、管下関係医療機関等に対して、接種に係る混乱が生じることのないよう情報提供について、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。

記

品目	製造販売業者	変更後の用法・用量
<ul style="list-style-type: none"> <li>・インフルエンザHAワクチン “化血研” TF</li> <li>・インフルエンザHAワクチン “化血研”</li> <li>・インフル “化血研” シリンジ</li> </ul>	化学及血清療法研究所	6ヶ月以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2～4週間の間隔をおいて2回注射する。13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1～4週間の間隔をおいて2回注射する。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ビケンHA」</li> <li>・フルービックHA</li> <li>・フルービックHAシリンジ</li> </ul>	阪大微生物病研究会	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・インフルエンザHAワクチン 「生研」</li> <li>・Fluーシリンジ「生研」</li> </ul>	デンカ生研	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・インフルエンザHAワクチン 「北里第一三共」</li> <li>・インフルエンザHAワクチン 「S北研」</li> <li>・インフルエンザHAワクチン 「北里第一三共」 シリンジ</li> </ul>	北里第一三共ワクチン	1歳以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2～4週間の間隔をおいて2回注射する。13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1～4週間の間隔をおいて2回注射する。